

DIARRHÉE

CONSEILS MÉDICAMENTEUX :

- SMECTA : 1 SACHET X3/JOUR
- RACECADOTRIL 1 COMPRIME X3/JOUR

SI PAS DE FIEVRE: IMODIUM : 1 COMPRIME TOUT DE SUITE PUIS 1
APRÈS CHAQUE SELLE SANS DEPASSER 6/JOUR

SI SPASM: SPASFON : 1 A 2 COMPRIME(S) X3/JOUR

CONSEILS HOMÉO/PHYTO:

- STOPPER AVEC LACTIBIANE IMMEDIA : 1STICK
/JOUR
- REFAIRE LA FLORE AVEC LACTIBIANE TOLERANCE
OU ATB OU ERGYPHILUS PLUS

CONSEILS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES:

- HYDRATATION +++ HYDRATIS CHEZ L'ADULTE / ADIARIL
CHEZ L'ENFANT
- ALIMENTATION: RIZ, PATES, BOUILLON, BRETZEL, VIANDE
MAIGRE, BANANE, POMME CUITE
- SI PAS D'ALLAITEMENT: CHANGER DE LAIT AVEC GALLIA
DIARGAL

CHEZ LA FEMME ENCEINTE : SMECTA ET
IMODIUM POSSIBLE